

UPA estima pérdidas en la fruta temprana del Bajo Cinca



Detalle de una explotación de frutales del Bajo Cinca dañada por el granizo tras la tormenta.

La organización agraria indica que los daños afectan entre el 20 y 30 % en zonas localizadas.

La tormenta de granizo del último fin de semana de abril dejó daños de diversa cuantía y proporción en zonas localizadas de las comarcas del Sobrarbe, Los Monegros y el Bajo Cinca, y su cuantía y alcance están por determinar en las peritaciones de los seguros agrarios.

Según el presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, el pedrisco en Los Monegros ha afectado a cereal y alfalfa de regadío en las zona de Lanaja, Poleñino y Alcubierre. **En el caso del Bajo Cinca, los efectos de esta última tormenta se localiza en Miralsot, Torrente de Cinca y Fraga "con daños en variedades tempranas".** A su parecer, "si las

primeras tormentas de la primavera llegan con piedra estamos un poco preocupados".

El secretario general de Uaga Aragón, José Manuel Penella, describe que de forma general "las lluvias mejoraron la situación del cereal de invierno y forrajes".

En el caso de los herbáceos, su situación "ha mejorado de forma considerable por las lluvias y además supone un plus para las zonas de pastos además de cebadas y trigos, salvo por el pedrisco puntual en algunas zonas", indica Penella.

"En resumen el fin de semana fue más beneficioso que dañino" para el sector agrario altoaragonés. No obstante, Penella se refiere al retraso de las siembras de maíz por la cantidad de

agua acumulada. "Se había empezado a sembrar y ahora supone un retraso".

Por su parte, el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche recuerda que las tormentas del fin de semana pasado en el Sobrarbe se centraron en la zona de Bielsa y Arcusa. "Como son zonas de forrajes y cereal los daños no son importantes porque las cebadas estaban encañadas pero todavía a medio espigar. Como la piedra cayó con agua no se puede hacer una valoración de pérdidas importantes", explica.

En su opinión, los daños por este último pedrisco han afectado más a la zona de Los Monegros. "Se centralizó un poco más la tormenta en la zona de Poleñino de cereales y forrajes", comentó. En el caso de Zaidín y Fraga, las afecciones se han centrado en variedades de fruta temprana con pérdidas de entre un 20 y un 30 por ciento, según datos los agricultores de la zona.

En líneas generales, los daños por estas últimas tormentas "no son generalizadas tanto en la zona productora de fruta como la ribera media y baja del Cinca".

En el contexto de la producción agraria de la provincia, "es un tema puntual y estamos esperando a que los peritos de Agroseguro puedan entrar a valorar los daños".

Fuente: Diario del Alto Aragón



www.centrodeserviciosagricolas.com
Camino de San Esteban s/n, 22510, Binaced (Huesca)
info@centrodeserviciosagricolas.com

productos y servicios para el campo

974 427 002

abonos

semillas

productos fitosanitarios

aplicación de tratamientos

alquiler de maquinaria

asesoría personalizada



Informaciones fitosanitarias de la temporada

Frutales

Manzano y peral

CARPOCAPSA *Cydia pomonella*
MOTEOADO *Venturia inaequalis* y
Venturia pyrina

FUEGO BACTERIANO *Erwinia amylovora*

Peral

SILA DEL PERAL *Cacopsylla pyri*

Melocotonero

PULGÓN VERDE *Myzus persicae*
POLILLA ORIENTAL *Cydia molesta*

Cerezo

MOSCA DE LAS ALAS MANCHADAS
Drosophila suzukii

Almendro

AVISPILLA DEL ALMENDRO *Eurytoma amygdali*

Olivo

PRAYS *Prays o leae*

ABICHADO *Euzofera Pingüis*

BARRENILLO *Phloeotribus scarabeoides*

POLILLA DEL JAZMÍN O
GLIFODES *Margarona Unionalis*

REPILO *Spilocaea oleagina*

Vid

OÍDIO *Erysiphe necator*

POLILLA DEL RÁCIMO *Lobesia botrana*

Cultivos extensivos

Cereales de invierno

MANCHA OVAL DEL TRIGO
Oculimacula spp.

OÍDIO *Erysiphe graminis*

ROYA AMARILLA *Puccinia striiformis*

ROYA PARDA *Puccinia recondita*
o *Puccinia tritica*

SEPTORIOSIS *Septoria tritici* y
Septoria nodorum

RINCOSPORIOSIS *R. secalis*

HELMINTOSPORIOSIS *P. teres*

Maíz

GUSANO DEL ALAMBRE

Hortícolas

Patata

POLILLA GUATEMALTECA *Tecia sonalimora*

Tomate

TUTA ABSOLUTA

Acelga

PULGÓN

PULGUILLA *Chaetocnema tibialis* y

Phyllotreta cruciferae

Varios cultivos agrícolas

HONGOS MILDIO Y BOTRITIS



Ayúdanos a encontrar la bacteria *Xylella Fastidiosa* que daña nuestros cultivos



Ayúdanos a proteger nuestros cultivos, ¡ayúdanos a encontrar la bacteria *Xylella Fastidiosa*!

Entre los insectos que transmiten la bacteria *Xylella Fastidiosa*, hay varias familias que reciben el nombre común de “espumaderas” porque sus formas juveniles (ninfas) viven en una especie de nidos de espuma. Desde el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal (CSCV) se vienen realizando prospecciones para conocer la distribución de estos vectores potenciales, localizar estas espumas nos dará información sobre el momento del año en que aparecen y sobre qué especies de plantas son las preferidas por estos insectos, lo que nos permitirá estar mejor preparados para controlar la bacteria si en algún momento se detecta su presencia en Aragón.

La presencia de espumas no indica que la bacteria esté presente.

Más información en el Boletín y las Informaciones Fitosanitarias, en la página web del Gobierno de Aragón: aragon.es “sanidad y certificación vegetal” y en twitter: [@redfaragon](https://twitter.com/redfaragon)

Si ves una espuma como éstas, AVÍSANOS:

Haz una foto y envíala junto con la localización a:

Twitter: [@redfaragon](https://twitter.com/redfaragon) Correo electrónico: cscv.agri@aragon.es

